

BEMUTATKOZIK: TATHRIN EC

- Egyedülálló szinergista hatóanyag összetétel: 5% cipermetrin + 2% imidakloprid
- Taglózó és tartamhatás
- Csótányoknál: harmadlagos hatás
- Kedvező ár – érték arány
- Ágyi poloska, csótány, hangya irtására engedélyezett



ÁGYI POLOSKA

csimaz, paklincs, bűdös féreg, palacka

- A nőstény naponta 2-3, élete során 200-400 petét rak a rejtekhelyén
- Évente 3-4 nemzedéke van
- Amikor a tápcsatornája csaknem teljesen üres, akkor indul táplálkozni
- 2-5 naponként szív vért (hűvös időben hetente)
- Vérszívás után azonnal visszahúzódik rejtekhelyére
- A fénytől irtózik, nem szereti a légmozgást és a zajt
- Szívesen vándorol felfelé, búvóhelyei lehetnek: képek, fali tükrök keretének, függönytartók, villanykapcsolók, konnektorok hézagjai, csillárok felfüggesztési helyei, bevert szögek nyílásai, falak ablakkeretekrepedései, könyvek, bútorok, ruhák, kárpitok, stb.
- Túlszaporodásuk esetén „láthatóvá válnak” a falakon, szegletekben, horpadásokban is.
- Döntően passzív módon használati tárgyakkal terjed, de épületen belül a szomszédos helyiségekbe csövek, szerelvények mentén aktívan is átjuthat.




Ágyi poloska – az irtásról



- A jelenleg engedélyezett eljárások csak a mozgó alakokat pusztítják el a PETÉKET NEM!
- Az irtószert azokra a felületekre kell kijuttatni, ahol az ágyi poloska pihen, tartózkodik, vagy mozog.
- A méregmezőt úgy kell kialakítani, hogy a bármilyen irányból érkező ágyi poloska azzal feltétlenül érintkezzen.
- Mivel az érintőmérgek a petékre nem hatásosak, ezért az első kezelést követően 12-14 nap múlva – a petékből kikelő lárvák elpusztítása céljából – a kezelést meg kell ismételni. Ez különösen fontos közepes, vagy erős fertőzés esetén.

Agrosol szervezésében végzett ágyi poloska terepvizsgálatok

Ágyi poloska tesztelési helyszínek funkciójuk szerint



Helyszín:

- Panel lakás, önkormányzati bérlakás (5 helyszín)
- Vendégház (1 helyszín)
- Hajléktalan szálló, munkásszálló, szociális otthon (4 helyszín)

A helyszín jellemzői:

- Korábbi védekezések
- Önálló épület, vagy nagyobb épületegyüttes része
- Épület állag, átjárhatóság, higiéniai állapot, zsúfoltság
- Helyszín funkciója
- Lakók / dolgozók mozgásának jellemzői, hozzáállásuk – együttműködő készségük
- Takarítási szokások
- Kezelendő felületek milyensége, potenciális rejtőzködő helyek elérhetősége

Ágyi poloska terepvizsgálatok szempontrendszere



Helyszín – a fertőzés mértékének és a körülmények felmérése:

- Friss vérnyomok mennyisége
- Régi vérnyomok mennyisége
- Levedlett kutikula mennyisége
- Kifejlett poloska mennyisége
- Mozgó, vérrel telt poloskák mennyisége
- Friss csípések mennyisége
- A helyszíni körülmények mennyire nehezítik a védekezést
- Zsúfoltság, rendetlenség



Következtetések – ágyi poloska terepvizsgálatok

„Alacsony kockázatú” helyszíneken

- Jó higiéniai körülmények, nem zsúfolt helyiségek, együttműködő lakók, dolgozók,
- A fertőzés korai felismerése (mielőtt felszaporodna, tojásokat rakna)
- Megfelelő termékválasztás, megfelelő dózis és lé mennyiség (5 liter / 100m²)
- Táplálkozási hely környezetének és a feltételezett rejtőzködő helyek, azok környezetének alapos kezelése. **TARTÓS MÉREGMEZŐ LÉTREHOZÁSA!!!**
- Visszaellenőrzés
 - A peték 7-28 nap alatt kelnek ki. Amennyiben ebben az időszakban nincs méregmező (pl. takarítás miatt) újbóli kezelésre van szükség.



A helyszínekkel és a fertőzöttséggel kapcsolatos általános tapasztalatok:



„Közepes – magas kockázatú” helyszínek – munkás szálló, szociális otthon, hajléktalan szálló

- A fertőzöttség mértéke **magas – nagyon magas**
- Sok a kezelést nehezítő körülmény
 - Higiéniai körülmények: közepes – nagyon rossz,
 - Dolgozók, lakók együttműködő készsége változó, inkább rossz
 - A lakók személyes holmijaihoz nem lehet hozzáférni
 - A kezelendő helyiségek többnyire nagyon zsúfoltak
 - Nagyon magas a behurcolás / újra fertőződés veszélye
- A kezelést követő 2-7. napon: **alacsony** fertőzöttség
- A kezelést követő 14. napon : **alacsony** fertőzöttség
- A megrendelők egy esetben részben a többi esetben teljesen elégedettek voltak a kezelések eredményével

Következtetések – ágyi poloska terepvizsgálatok



Magas kockázatú” helyszíneken:

- Kérdéses higiéniai körülmények, zsúfolt helyiségek, kevésbé együttműködő lakók, dolgozók,
- Jellemző a magas fertőzöttség, pete, nimfa, kifejlett rovar egyidejű jelenléte
- Nagy a behurcolás, újra fertőződés kockázata
- Megfelelő higiénias körülmények megteremtése
- Megfelelő termékválasztás, megfelelő dózis és munkaoldat mennyiség (5 liter/100m²)
- Táplálkozási hely környezetének és a feltételezett rejtőzködő helyek, azok környezetének alapos kezelése.
- **TARTÓS MÉREGMEZŐ LÉTREHOZÁSA!!!**
- Füstképző készítmény, vagy hidegködös kiegészítő kezelés
- Visszaellenőrzés – és rendszeres irtás
 - Megakadályozza a felszaporodást, elfogadható szinten tartja a fertőzöttséget

Ágyi poloska terepvizsgálatok
következtetés:



A terepvizsgálatokban mind a Tathrin EC, mind a Bombex Farumy készítmény biztosította a taglózó hatást és a tartós méregmezőt.