

A biocid termék jellemzőinek összefoglalója

Termék neve: Gardentop rágcsálóirtó pép

Termék típusa(i): 14. terméktípus - Rágcsálóirtó szerek (Kártevő elleni védekezésre használt szerek)

Engedélyszám: HU-2013-MA-14-00048-0000

R4BP 3 tétel hivatkozási száma: HU-0000293-0000

Tartalomjegyzék

Adminisztratív információk	1
1.1. A termék kereskedelmi nevei	1
1.2. Engedélyes	1
1.3. Biocid termékek gyártója/gyártói	1
1.4. A hatóanyag(ok) gyártója/gyártói	2
2. A termék összetétele és a formuláció típusa	2
2.1. Biocid termék összetételére vonatkozó minőségi és mennyiségi információ	2
2.2. Az előállítás típusa	2
3. Figyelmeztető és óvintézkedésekre vonatkozó mondatok	3
4. Engedélyezett felhasználás(ok)	3
4.1.1 Felhasználásra vonatkozó specifikus előírások	6
4.1.2 Felhasználásra vonatkozó specifikus kockázatcsökkentő intézkedések	7
4.1.3 A felhasználás során valószínűsíthető közvetlen vagy közvetett hatások részletei, az elsősegély-nyújtási előírások és a környezet védelmét célzó óvintézkedések	8
4.1.4 A felhasználástól függően a termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására vonatkozó előírások	8
4.1.5 A felhasználástól függően a termék tárolási feltételei és eltarthatósági ideje szokásos tárolási feltételek mellett	8
5. Általános használati utasítás	9
5.1. Használati utasítások	9
5.2. Kockázatcsökkentő intézkedések	9
5.3. Várható közvetlen vagy közvetett hatások részletes leírása, az elsősegélynyújtási előírások és a környezetvédelmi óvintézkedések	9
5.4. A termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására vonatkozó előírások	9
5.5. A termék tárolási feltételei és eltarthatósági ideje szokásos tárolási feltételek mellett	9
6. Egyéb információk	9

Adminisztratív információk

1.1. A termék kereskedelmi nevei

Gardentop rágcsálóirtó pép
Stopp rágcsálóirtó pép
Bromatec P-50 rágcsálóirtó pép
Gardentop plusz rágcsálóirtó pép
Contratop rágcsálóirtó pép
Contratop plusz rágcsálóirtó pép
Stermibrom rágcsálóirtó pép

1.2. Engedélyes

Az engedélyes neve és címe	Név	ZAPI S.p.A.
	Cím	via Terza Strada 12 35026 Conselve Olaszország
Engedélyszám	HU-2013-MA-14-00048-0000	
R4BP 3 tétel hivatkozási száma	HU-0000293-0000	
Az engedélyezés dátuma	07/02/2013	
Az engedély lejáratának dátuma	31/08/2020	

1.3. Biocid termékek gyártója/gyártói

A gyártó neve	Zapi S.p.A.
A gyártó címe	Via Terza Strada 12. 35026 Conselve (PD) Olaszország
Gyártási helyek	Via Terza Strada 12. 35026 Conselve (PD) Olaszország

1.4. A hatóanyag(ok) gyártója/gyártói

Hatóanyag	12 - Bromadiolon
A gyártó neve	PM Tezza S.r.l.
A gyártó címe	Viale del Lavoro 326 37050 Angiari (VR) Olaszország
Gyártási helyek	Via Tre Ponti 22 37050 S. Maria di Zevio (VR) Olaszország

2. A termék összetétele és a formuláció típusa

2.1. Biocid termék összetételére vonatkozó minőségi és mennyiségi információ

Triviális név	IUPAC-név	Funkció	CAS-szám	EK-szám	Tartalom (%)
Bromadiolon	3-[3-(4'-Bromo[1,1'-biphenyl]-4-yl)-3-hydroxy-1-phenylpropyl]-4-hydroxy-2H-1-benzopyran-2-one	Hatóanyag	28772-56-7	249-205-9	0.005

2.2. Az előállítás típusa

RB - Csalétek (felhasználásra kész)

3. Figyelmeztető és óvintézkedésekre vonatkozó mondatok

Figyelmeztető mondatok

Károsíthatja a születendő gyermeket.
Ismétlődő vagy hosszabb expozíció esetén (vér) károsítja a szerveket vér.

Óvintézkedésre vonatkozó mondatok

Elzárva tárolandó.
A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni.
Védőkesztyű használata kötelező.
Expozíció vagy annak gyanúja esetén: Orvosi ellátást kell kérni.
A tartalom elhelyezése hulladékként: a helyi előírásoknak megfelelően.
A edény elhelyezése hulladékként: a helyi előírásoknak megfelelően.
Használat előtt ismerje meg az anyagra vonatkozó különleges utasításokat.
Ne használja addig, amíg az összes biztonsági óvintézkedést el nem olvasta és meg nem értette.

4. Engedélyezett felhasználás(ok)

4.1 A felhasználás leírása

Felhasználás 1 - Szakképzett foglalkozásszerű felhasználók

Terméktípus

14. terméktípus - Rágcsálóirtó szerek (Kártevő elleni védekezésre használt szerek)

Az engedélyezett felhasználás pontos leírása, amennyiben indokolt

Zárt térben és az épületek környékén: egér- és patkányirtásra

Célorganizmus(ok) (beleértve a fejlődési szakaszt is)

Mus musculus-házi egérfiatal és ivarérett egyedek
Rattus norvegicus-vándorpatkányfiatal és ivarérett egyedek

Felhasználási terület

Beltéri
Kültéri
Zárt térben és az épületek környékén: egér- és patkányirtásra

Az alkalmazás módja(i)

Csalétek alkalmazása -
- A 3–15 kg töltőtömegű kiserelések külső csomagolásán
• A készítményt olyan helyeken alkalmazzuk, ahol rágcsálók előfordulása észlelhető.

- A nyomok vagy látható károkozások alapján becsüljük meg, milyen mértékben szaporodtak el a rágcsálók, majd a kezelést ennek ismeretében végezzük.
- Az irtás megkezdése előtt mérlegeljük, hogy az adott területen a csalétek hatóanyaga (bromadiolon) elleni rezisztencia veszélye fennáll-e .
- A csalétek kihelyezése előtt lehetőség szerint minden más táplálékforrást távolítsunk el.
- A rágcsálóirtó pépeket - a tasakok felnyitása nélkül - az erre a célra szolgáló szerelvényben helyezük az egerek és patkányok által látogatott helyekre, azok vonulási útjaira illetve feltételezett búvóhelyük közelébe.

A Gardentop rágcsálóirtó pép alkalmazási dózisa egerek irtásakor:

- 2-5 méterenként 45-50 gramm csalétek.

A Gardentop rágcsálóirtó pép alkalmazási dózisa patkányok irtásakor:

- 5-10 méterenként 90-100 gramm csalétek.

• A rágcsálóirtó szer kihelyezésére szolgáló szerelvényeket - a 38/2003. (VII. 7.) ESZCSM-FVM-KvVM együttes rendelet 8. számú mellékletének megfelelően - feltűnő jelzéssel kell ellátni és azokon fel kell tüntetni: a rágcsálóirtó szer nevét, hatóanyagát, ellenszerét, valamint az alkalmazó nevét, címét és telefonszámát.

- Az etetőhelyeket kezdetben naponta, utána hetente egyszer ellenőrizzük és az elfogyasztott csalétket pótoljuk. A megromlott vagy penészes csalétket cseréljük ki. Az ellenőrzést ezt követően hetente ismétljük meg .
- Ha a kihelyezett csalétek folyamatosan elfogy, akkor létesítsünk több etetőhelyet, az egyes etetőhelyeken kihelyezett csalétek mennyiségét viszont ne növeljük .
- Amennyiben a csalétek érintetlenül maradnak, de a rágcsálók továbbra is jelen vannak, helyezzük át az irtószert máshova.
- A véralvadásgátló hatóanyag késleltetett hatása miatt a rágcsálók elpusztulása a fogyasztás után 3- 5 nappal várható.
- A csalétket csak addig hagyjuk kint, amíg azt a rágcsálók aktivitása indokolja.
- A kezelés, a rágcsálók elszaporodásának mértékétől függően, 2-6 hetet vehet igénybe.
- A kezelés után az etetőállomásokat gyűjtsük össze, az esetlegesen kiszóródott irtószert takarítsuk fel.

- A rágcsálóirtó pépet tartalmazó műanyag tálcás kiszerelések csomagolásán

- A készítményt olyan helyeken alkalmazzuk, ahol rágcsálók előfordulása észlelhető.

- A nyomok vagy látható károkozások alapján becsüljük meg, milyen mértékben szaporodtak el a rágcsálók, majd a kezelést ennek ismeretében végezzük.
- Az irtás megkezdése előtt mérlegeljük, hogy az adott területen a csalétek hatóanyaga (bromadiolon) elleni rezisztencia veszélye fennáll-e.
- A csalétek kihelyezése előtt lehetőség szerint minden más táplálékforrást távolítsunk el.
- A rágcsálóirtó tálca tetején lévő fóliát húzzuk le, majd a műanyag tálcát az erre a célra szolgáló szerelvényben helyezük az egerek és patkányok által látogatott helyekre azok vonulási útjaira illetve feltételezett búvóhelyük közelébe.

A Gardentop rágcsálóirtó pépet tartalmazó tálca alkalmazási dózisa egerek irtásakor:

- 2-5 méterenként 1 db 50 grammos tálca.

A Gardentop rágcsálóirtó pépet tartalmazó tálca alkalmazási dózisa patkányok irtásakor:

- 5-10 méterenként 1 db 100 grammos tálca .

- A rágcsálóirtó szer kihelyezésére szolgáló szerelvényeket - a 38/2003. (VII. 7.) ESZCSM-FVM-K vVM együttes rendelet 8. számú mellékletének megfelelően- feltűnő jelzéssel kell ellátni és azokon fel kell tüntetni: a rágcsálóirtó szer nevét, hatóanyagát, ellenszerét, valamint az alkalmazó nevét, címét és telefonszámát.
- Az etetőhelyeket kezdetben naponta, utána hetente egyszer ellenőrizzük és az elfogyasztott csalétket pótoljuk. A megromlott vagy penészes csalétket cseréljük ki. Az ellenőrzést ezt követően hetente ismétljük meg .
- Ha a kihelyezett csalétek folyamatosan elfogy, akkor létesítsünk több etetőhelyet, az egyes etetőhelyeken kihelyezett csalétek mennyiségét viszont ne növeljük.
- Amennyiben a csalétek érintetlenül maradnak, de a rágcsálók továbbra is jelen vannak, helyezzük át az irtószert máshova .
- A véralvadásgátló hatóanyag késleltetett hatása miatt a rágcsálók elpusztulása a fogyasztás után 3- 5 nappal várható.

- A csalétket csak addig hagyjuk kint, amíg azt a rágcsálók aktivitása indokolja.
- A kezelés, a rágcsálók elszaporodásának mértékétől függően, 2-6 hetet vehet igénybe.
- A kezelés után az etetőállomásokat gyűjtsük össze, az esetlegesen kiszóródott irtószert takarítsuk fel.

- A rágcsálóirtó pépet tartalmazó műanyag tubusos kiserelések csomagolásán

- A készítményt olyan helyeken alkalmazzuk, ahol rágcsálók előfordulása észlelhető.
- A nyomok vagy látható károkozások alapján becsüljük meg, milyen mértékben szaporodtak el a rágcsálók, majd a kezelést ennek ismeretében végezzük.
- Az irtás megkezdése előtt mérlegeljük, hogy az adott területen a csalétek hatóanyaga (bromadiolon) elleni rezisztencia veszélye fennáll-e.
- A csalétek kihelyezése előtt lehetőség szerint minden más táplálékforrást távolítsunk el.
- A rágcsálóirtó pép a tubusból arra alkalmas pisztoly segítségével juttatható ki. A készítmény, a kijuttató eszköz segítségével képzett vékony csíkok formájában, rágcsálóirtó szerelvény alá nyomva helyezhető ki.

Alkalmazási mennyisége: 10-20 gramm pép/rágcsálóirtó szerelvény/m²

- (1) Első használat előtt vágjuk le a tubus tetejéről a csavarment feletti részt.
 - (2) A műanyag toldalékot szorosan csavajuk rá a felnyitott tubusra.
 - (3) Csavarjuk le a védőkupakot a toldalék hegyéről.
 - (4) A tubust helyezük a kijuttató eszközbe.
 - (5) Érintsük a tubus hegyét a szerelvény aljához, majd lassan nyomjuk be a dugattyút, mindaddig, amíg a kívánt mennyiségű pép el nem hagyja a tartályt.
 - (6) A kezelés befejeztével a védőkupakot helyezzük vissza a kijuttató toldalékra.
- A pépet tartalmazó szerelvényt helyezzük az egerek és patkányok által látogatott helyekre, azok vonulási útjaira illetve feltételezett búvóhelyük közelébe.

A rágcsálóirtó szer kihelyezésére szolgáló szerelvényeket- a 38/2003. (VII. 7.) ESZCSM-FVM-K vVM együttes rendelet 8. számú mellékletének megfelelően - feltűnő jelzéssel kell ellátni és azokon fel kell tüntetni: a rágcsálóirtó szer nevét, hatóanyagát, ellenszerét, valamint az alkalmazó nevét, címét és telefonszámát.

- Az etetőhelyeket kezdetben naponta, utána hetente egyszer ellenőrizzük és az elfogyasztott csalétket pótoljuk. A megromlott vagy penészes csalétket cseréljük ki. Az ellenőrzést ezt követően hetente ismétljük meg.

- Ha a kihelyezett csalétek folyamatosan elfogy, akkor létesítsünk több etetőhelyet, az egyes etetőhelyeken kihelyezett csalétek mennyiségét viszont ne növeljük.

- Amennyiben a csalétek érintetlenül maradnak, de a rágcsálók továbbra is jelen vannak, helyezzük át az irtószert máshova.
- A véralvadást gátló hatóanyag késleltetett hatása miatt a rágcsálók elpusztulása a fogyasztás után 3- 5 nappal várható.
- A csalétket csak addig hagyjuk kint, amíg azt a rágcsálók aktivitása indokolja.
- A kezelés, a rágcsálók elszaporodásának mértékétől függően, 2-6 hetet vehet igénybe.
- A kezelés után az etetőállomásokat gyűjtsük össze, az esetlegesen kiszóródott irtószert takarítsuk fel.

A felhasználás mértéke és gyakorisága

- A Gardentop rágcsálóirtó pép alkalmazási dózisa egerek irtásakor: 2-5 méterenként 45-50 gramm csalétek. - A Gardentop rágcsálóirtó pép alkalmazási dózisa patkányok irtásakor: 5-10 méterenként 90-100 gramm csalétek. - A Gardentop rágcsálóirtó pépet tartalmazó tálca alkalmazási dózisa egerek irtásakor: 2-5 méterenként 1 db 50 grammos tálca. - A Gardentop rágcsálóirtó pépet tartalmazó tálca alkalmazási dózisa patkányok irtásakor: 5-10 méterenként 1 db 100 grammos tálca. - Műanyag tubusos. Alkalmazási mennyisége: 10-20 gramm pép/rágcsálóirtó szerelvény/m² - 0 -
 - A Gardentop rágcsálóirtó pép alkalmazási dózisa egerek irtásakor: 2-5 méterenként 45-50 gramm csalétek.
 - A Gardentop rágcsálóirtó pép alkalmazási dózisa patkányok irtásakor: 5-10 méterenként 90-100 gramm csalétek.
 - A Gardentop rágcsálóirtó pépet tartalmazó tálca alkalmazási dózisa egerek irtásakor: 2-5 méterenként 1 db 50 grammos tálca.
 - A Gardentop rágcsálóirtó pépet tartalmazó tálca alkalmazási dózisa patkányok irtásakor: 5-10 méterenként 1 db 100 grammos tálca.
 - Műanyag tubusos. Alkalmazási mennyisége: 10-20 gramm pép/rágcsálóirtó szerelvény/m²

Felhasználói kör

Szakképzett felhasználó

Csomagolási méretek és csomagolóanyagok

Kiszерelés egysége: 10 vagy 15 grammos, egyedileg tasakolt pép.
- műanyag vödörben (3 , 4, 5, 8, 10 és 15 kg);
- műanyaggal bélelt kartondobozban (5, 8, 10 és 15 kg);
- műanyag vödörbe helyezett műanyag zacskóban (5 és 10 kg)
- műanyag tálcán (50 és 100 gramm);
- kartondobozba helyezett műanyag tálcán (50 és 100 gramm);
- műanyag tubusban (200, 300, 400, 500 és 600 gramm)

4.1.1 Felhasználásra vonatkozó specifikus előírások

- A 3–15 kg töltőtömegű kiszeralések külső csomagolásán

- A készítményt olyan helyeken alkalmazzuk, ahol rágcsálók előfordulása észlelhető.
- A nyomok vagy látható károkozások alapján becsüljük meg, milyen mértékben szaporodtak el a rágcsálók, majd a kezelést ennek ismeretében végezzük.
- Az irtás megkezdése előtt mérleljük, hogy az adott területen a csalétek hatóanyaga (bromadiolon) elleni rezisztencia veszélye fennáll-e .

- A csalétek kihelyezése előtt lehetőség szerint minden más táplálékforrást távolítsunk el.

- A rágcsálóirtó pépeket - a tasakok felnyitása nélkül - az erre a célra szolgáló szerelvényben helyezük az egerek és patkányok által látogatott helyekre, azok vonulási útjaira illetve feltételezett búvóhelyük közelébe.

A Gardentop rágcsálóirtó pép alkalmazási dózisa egerek irtásakor:

- 2-5 méterenként 45-50 gramm csalétek.

A Gardentop rágcsálóirtó pép alkalmazási dózisa patkányok irtásakor:

- 5-10 méterenként 90-100 gramm csalétek.

- A rágcsálóirtó szer kihelyezésére szolgáló szerelvényeket - a 38/2003. (VII. 7.) ESZCSM-FVM-KvVM együttes rendelet 8. számú mellékletének megfelelően - feltűnő jelzéssel kell ellátni és azokon fel kell tüntetni: a rágcsálóirtó szer nevét, hatóanyagát, ellenszerét, valamint az alkalmazó nevét, címét és telefonszámát.

- Az etetőhelyeket kezdetben naponta, utána hetente egyszer ellenőrizzük és az elfogyasztott csalétket pótoljuk. A megromlott vagy penészes csalétket cseréljük ki. Az ellenőrzést ezt követően hetente ismételjük meg .

- Ha a kihelyezett csalétek folyamatosan elfogy, akkor létesítsünk több etetőhelyet, az egyes etetőhelyeken kihelyezett csalétek mennyiségét viszont ne növeljük .

- Amennyiben a csalétek érintetlenül maradnak, de a rágcsálók továbbra is jelen vannak, helyezzük át az irtószert máshova.

- A véralvadást gátló hatóanyag késleltetett hatása miatt a rágcsálók elpusztulása a fogyasztás után 3- 5 nappal várható.

- A csalétket csak addig hagyjuk kint, amíg azt a rágcsálók aktivitása indokolja.

- A kezelés, a rágcsálók elszaporodásának mértékétől függően, 2-6 hetet vehet igénybe.

- A kezelés után az etetőállomásokat gyűjtsük össze, az esetlegesen kiszóródott irtószert takarítsuk fel.

- A rágcsálóirtó pépet tartalmazó műanyag tálcás kiszeralések csomagolásán

- A készítményt olyan helyeken alkalmazzuk, ahol rágcsálók előfordulása észlelhető.

- A nyomok vagy látható károkozások alapján becsüljük meg, milyen mértékben szaporodtak el a rágcsálók, majd a kezelést ennek ismeretében végezzük.

- Az irtás megkezdése előtt mérleljük, hogy az adott területen a csalétek hatóanyaga (bromadiolon) elleni rezisztencia veszélye fennáll-e.

- A csalétek kihelyezése előtt lehetőség szerint minden más táplálékforrást távolítsunk el.

- A rágcsálóirtó tálca tetején lévő fóliát húzzuk le, majd a műanyag tálcát az erre a célra szolgáló szerelvényben helyezük az egerek és patkányok által látogatott helyekre azok vonulási útjaira illetve feltételezett búvóhelyük közelébe.

A Gardentop rágcsálóirtó pépet tartalmazó tálca alkalmazási dózisa egerek irtásakor:

- 2-5 méterenként 1 db 50 grammos tálca.

A Gardentop rágcsálóirtó pépet tartalmazó tálca alkalmazási dózisa patkányok irtásakor:

- 5-10 méterenként 1 db 100 grammos tálca .

- A rágcsálóirtó szer kihelyezésére szolgáló szerelvényeket - a 38/2003. (VII. 7.) ESZCSM-FVM-K vvm együttes rendelet 8. számú mellékletének megfelelően - feltűnő jelzéssel kell ellátni és azokon fel kell tüntetni: a rágcsálóirtó szer nevét, hatóanyagát, ellenszerét, valamint az alkalmazó nevét, címét és telefonszámát.

- Az etetőhelyeket kezdetben naponta, utána hetente egyszer ellenőrizzük és az elfogyasztott csalétket pótoljuk. A megromlott vagy penészes csalétket cseréljük ki. Az ellenőrzést ezt követően hetente ismétéljük meg .

- Ha a kihelyezett csalétek folyamatosan elfogy, akkor létesítsünk több etetőhelyet, az egyes etetőhelyeken kihelyezett csalétek mennyiségét viszont ne növeljük.

- Amennyiben a csalétek érintetlenül maradnak, de a rágcsálók továbbra is jelen vannak, helyezzük át az irtószert máshova .

- A véralvadást gátló hatóanyag késleltetett hatása miatt a rágcsálók elpusztulása a fogyasztás után 3- 5 nappal várható.

- A csalétket csak addig hagyjuk kint, amíg azt a rágcsálók aktivitása indokolja.

- A kezelés, a rágcsálók elszaporodásának mértékétől függően, 2-6 hetet vehet igénybe.

- A kezelés után az etetőállomásokat gyűjtsük össze, az esetlegesen kiszóródott irtószert takarítsuk fel.

- A rágcsálóirtó pépet tartalmazó műanyag tubusos kiserelések csomagolásán

- A készítményt olyan helyeken alkalmazzuk, ahol rágcsálók előfordulása észlelhető.

- A nyomok vagy látható károkozások alapján becsüljük meg, milyen mértékben szaporodtak el a rágcsálók, majd a kezelést ennek ismeretében végezzük .

- Az irtás megkezdése előtt mérlegeljük, hogy az adott területen a csalétek hatóanyaga (bromadiolon) elleni rezisztencia veszélye fennáll-e.

- A csalétek kihelyezése előtt lehetőség szerint minden más táplálékforrást távolítsunk el.

- A rágcsálóirtó pép a tubusból arra alkalmas pisztoly segítségével juttatható ki. A készítmény, a kijuttató eszköz segítségével képzett vékony csíkok formájában, rágcsálóirtó szerelvény aljára nyomva helyezhető ki.

Alkalmazási mennyisége: 10-20 gramm pép/rágcsálóirtó szerelvény/m²

(1) Első használat előtt vágjuk le a tubus tetejéről a csavarment feletti részt.

(2) A műanyag toldalékot szorosan csavajjuk rá a felnyitott tubusra.

(3) Csavarjuk le a védőkupakot a toldalék hegyéről.

(4) A tubust helyezzük a kijuttató eszközbe.

(5) Érintsük a tubus hegyét a szerelvény aljához, majd lassan nyomjuk be a dugattyút, mindaddig, amíg a kívánt mennyiségű pép el nem hagyja a tartályt.

(6) A kezelés végeztével a védőkupakot helyezzük vissza a kijuttató toldalékra.

- A pépet tartalmazó szerelvényt helyezzük az egerek és patkányok által látogatott helyekre, azok vonulási útvajra illetve feltételezett búvóhelyük közelébe .

A rágcsálóirtó szer kihelyezésére szolgáló szerelvényeket- a 38/2003. (VII. 7.) ESZCSM-FVM-K vvm együttes rendelet 8. számú mellékletének megfelelően - feltűnő jelzéssel kell ellátni és azokon fel kell tüntetni: a rágcsálóirtó szer nevét, hatóanyagát, ellenszerét, valamint az alkalmazó nevét, címét és telefonszámát.

- Az etetőhelyeket kezdetben naponta, utána hetente egyszer ellenőrizzük és az elfogyasztott csalétket pótoljuk. A megromlott vagy penészes csalétket cseréljük ki. Az ellenőrzést ezt követően hetente ismétéljük meg.

- Ha a kihelyezett csalétek folyamatosan elfogy, akkor létesítsünk több etetőhelyet, az egyes etetőhelyeken kihelyezett csalétek mennyiségét viszont ne növeljük.

- Amennyiben a csalétek érintetlenül maradnak, de a rágcsálók továbbra is jelen vannak, helyezzük át az irtószert máshova.

- A véralvadást gátló hatóanyag késleltetett hatása miatt a rágcsálók elpusztulása a fogyasztás után 3- 5 nappal várható.

- A csalétket csak addig hagyjuk kint, amíg azt a rágcsálók aktivitása indokolja.

- A kezelés, a rágcsálók elszaporodásának mértékétől függően, 2-6 hetet vehet igénybe.

- A kezelés után az etetőállomásokat gyűjtsük össze, az esetlegesen kiszóródott irtószert takarítsuk fel.

4.1.2 Felhasználásra vonatkozó specifikus kockázatcsökkentő intézkedések

Figyelmeztetés:

Kizárólag rágcsálóirtásra és csak a használati utasítás szerint alkalmazható!

A csalétket olyan helyekre rakja ki, ahol gyermekek, házi- és vadon élő állatok, madarak, valamint más, nem célszervezet állatok nem férhetnek hozzá.

Az irtószer kihelyezésekor használjon védőkesztyűt. Munka közben tilos enni, inni vagy dohányozni! Kihelyezés után meleg, szappanos vízzel alaposan kezelt kell mosni.
Beszennyezett, romlott rágcsálóirtó szert ne használjon fel.
Élelmiszertől és takarmánytól elkülönítve, gyermek és nem célszervezet állatok által hozzá nem férhető, száraz, hűvös helyen, eredeti csomagolásban tárolandó.
A készítmény mérgező az emlősökre és a madarakra. A kutya, macska, sertés és minden egyéb ragadozó és/vagy dögevő állat mérgeződhet, ha a rágcsálóirtó szertől elpusztult vagy legyengült patkányt, egeret elfogyasztja.
Tilos a készítményt nem célszervezet állatok elpusztítására használni. Ne juttassa a készítményt élővízbe.
Biztonsági adatlap foglalkozásszerű felhasználók kérésére rendelkezésre áll.

4.1.3 A felhasználás során valószínűsíthető közvetlen vagy közvetett hatások részletei, az elsősegély-nyújtási előírások és a környezet védelmét célzó óvintézkedések

Elsősegélynyújtás:

Esetleges mérgezés vagy annak gyanúja esetén azonnal orvoshoz kell fordulni és a címkét az orvosnak meg kell mutatni!

Lenyelés esetén:

- Lenyelés esetén azonnal forduljon orvoshoz és mutassa meg a termék dobozát, címkéjét vagy biztonsági adatlapját.
- Hánytatás csak az orvos kifejezett utasítására történhet.
- A szájüreget öblítse ki vízzel.
- Eszméletlen személynek semmit ne adjon szájon át.

Bőrre jutáskor:

- Vegye le a szennyezett ruhát és a további használat előtt mossa ki.
- A bőrt bő szappanos vízzel mossa le.
- Panasz jelentkezésekor forduljon szakorvoshoz.

Szembe jutás esetén:

- Ha a szemben kontaktlencse van, azt távolítsa el.
- A szemet tartsa nyitva és néhány percen keresztül bő vízzel, óvatosan öblítse ki.
- Panasz jelentkezésekor forduljon szakorvoshoz.

Útmutatás az orvosnak:

A készítmény véralvadásgátló hatóanyagot, bromadiolont tartalmaz. A rágcsálóirtó szer lenyelését követően csökkenhet a véralvadási képesség és belső vérzés jelentkezhet. A mérgezés/expozíció és a tünetek jelentkezése között akár több nap is eltelhet. A készítményt lenyelő mérgezett ellátásakor, amennyiben a jellemző tüneteket (pl. orrvérzés, ínyvérzés, vérköpés, véres vizelet, hosszabb véralvadási idő, nagy kiterjedésű vagy több haematoma, hirtelen fellépő, szokatlan viscerális fájdalom) észleli, adjon K1-vitamint. Ha nem észlelhető vérzés, akkor a mérgezett ellátásakor és az expozíciót követő 48-72 óra elteltével a protrombin időt (INR) meg kell mérni. Ha a protrombin idő értéke >4, a mérgezettnek intravénásan K1-vitamint kell adni. A kezelés többszöri megismétlésére is szükség lehet.

Ellenszere: K1-vitamin (A kezelés hatásosságát laboratóriumi módszerrel ellenőrizni szükséges.)

4.1.4 A felhasználástól függően a termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására vonatkozó előírások

Hulladékkezelés:

A foglalkozásszerű felhasználóknak szánt kiszerezések csomagolásán feltüntetendő:

A közegészségügyi veszély és a másodlagos mérgezések megelőzése érdekében, az ellenőrzésekkel párhuzamosan gondoskodni kell a kezelés során elpusztult rágcsálók eltávolításáról. A foglalkozásszerű felhasználók az elhullott rágcsálók tetemeinek veszélyes hulladékként történő megsemmisítéséről a 98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet előírásai szerint kötelesek gondoskodni.

Minden forgalomba kerülő kiszerezésen feltüntetendő:

A kezelés után az etetőhelyeket szüntessük meg. Gyűjtjük össze a megmaradt irtószert, valamint a rágcsálóirtó szerelvényeket és csalétekállomásokat. Gondoskodjunk az esetlegesen kiszóródott irtószer feltakarításáról.
Az eredeti céljára fel nem használható, hulladékká vált irtószert veszélyes hulladékként kell kezelni és veszélyes hulladék átvevő helyre - pl. hulladékudvar - kell leadni.

4.1.5 A felhasználástól függően a termék tárolási feltételei és eltarthatósági ideje szokásos tárolási feltételek mellett

Eltarthatóság és tárolás:

Eredeti, zárt csomagolásban, fénytől védett, száraz, hűvös, jól szellőző helyen tárolva, a gyártástól számítva 2 évig használható fel. (A gyártás idejét az egyedi csomagolásokon fel kell tüntetni!)

5. Általános használati utasítás

5.1. Használati utasítások

Lásd: 4.1.1.

5.2. Kockázatcsökkentő intézkedések

Lásd: 4.1.2.

5.3. Várható közvetlen vagy közvetett hatások részletes leírása, az elsősegélynyújtási előírások és a környezetvédelmi óvintézkedések

Lásd: 4.1.3.

5.4. A termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására vonatkozó előírások

Lásd: 4.1.4.

5.5. A termék tárolási feltételei és eltarthatósági ideje szokásos tárolási feltételek mellett

Lásd: 4.1.5.

6. Egyéb információk

- A késleltetett hatásmechanizmus miatt a véralvadásgátló rágcsálóirtó a csalétek elfogyasztása után 4-10 nappal váltja ki hatását.
 - A rágcsálók betegséget hordozhatnak. Eltávolításuk során az elpusztult rágcsálókat ne érintse meg pusztán kézzel, használjon kesztyűt vagy egyéb eszközt, például fogót.
 - A termék keserű anyagot és festékanyagot tartalmaz.
-

A címkefelirat tartalmazza:

Gardentop rágcsálóirtó pép vagy **Stopp rágcsálóirtó pép** vagy **Bromatec P-50 rágcsálóirtó pép** vagy **Gardentop plusz rágcsálóirtó pép** vagy **Contratop rágcsálóirtó pép** vagy **Contratop plusz rágcsálóirtó pép** vagy **Stermibrom rágcsálóirtó pép**

Hatóanyaga: 0,005% bromadiolon

Ellenszere: K1-vitamin

Gyártja: Zapi S.p.A., Via Terza Strada 12, 35026 Conselve (PD), Olaszország

Forgalmazza: Zapi S.p.A., Via Terza Strada 12, 35026 Conselve (PD), Olaszország

NNK engedélyszám: HU-2013-MA-14-00048-0000

A műanyag rágcsálóirtó dobozokon feltüntetendő az alábbi szöveg:

Gardentop rágcsálóirtó pép vagy **Stopp rágcsálóirtó pép** vagy **Bromatec P-50 rágcsálóirtó pép** vagy **Gardentop plusz rágcsálóirtó pép** vagy **Contratop rágcsálóirtó pép** vagy **Contratop plusz rágcsálóirtó pép** vagy **Stermibrom rágcsálóirtó pép**

Hatóanyaga: 0,005% bromadiolon

Ellenszere: K1-vitamin

Gyártja: Zapi S.p.A. (Olaszország)

Forgalmazza: Zapi S.p.A. (Olaszország)

NNK engedélyszám: HU-2013-MA-14-00048-0000